



OLIVERA

Avís de tractament Mosca de l'Olivera (*Bactrocera oleae* Gmel.)

L'índex de picada és molt irregular, per la qual cosa cal estar atents a la seua evolució en les nostres parcel·les. És molt important mantindre operatives les botelles tipus "olipe" en les zones de parany massiu, ja que a partir d'ara se solen produir increments importants de població.

En el cas de detectar picada nova es pot optar per tractament d'esquer o tractament total. En tractaments tardans, cal tindre en compte en l'elecció del producte fitosanitari el seu termini de seguretat.

Productes:

Tractament d'esquer: deltametrin 10% + proteïna (t.s. 7 dies); lambda cihalotrin 1,5% + proteïna (t.s. 7 dies); spinosad (t.s. 7 dies).

Tractaments a tot l'arbre: acetamiprid 20% (t.s. 28 dies); cipermetrin 5% (t.s. 3 dies); deltametrin (t.s. 7 dies); fosmet 50% (t.s. 21 dies); lambda cihalotrin 1,5% (t.s. 7 dies) i 5% (t.s. 14 dies).

Si optem pel tractament total, es pot aprofitar per a realitzar al mateix temps un tractament contra l'ull de gall amb algun compost de coure autoritzat, especialment en zones poc airejades i propenses a boires.

Silla (València), 14 de setembre de 2020

