



VINYA

Avís de tractament per la zona centre de València:

*Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Torís, Godelleta,
Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos i Villar del Arzobispo*

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*)

Igual que en anteriors anys, el seguiment del cycle biològic del cuc del raïm de la vinya s'està realitzant coordinadament entre els tècnics de Cooperatives Agroalimentaries de vinya i el Servei de Sanitat Vegetal.

De l'observació dels paranys es dedueix que el cycle biològic de la plaga porta un avançament d'aproximadament uns 10 dies respecte a l'any anterior, havent-se detectat els primers adults d'aquesta 2^a generació, en les zones més càlides, durant els últims dies del mes de maig.



Ou groc sobre gra

A principis d'aquesta setmana s'han vist les primeres postes sobre raïms, la immensa majoria d'elles en estat d'ou blanc, acabat de posar. En aquests moments s'observen ja els primers ous grocs, els quals començaran a fer eclosió previsiblement aquest cap de setmana.

Per tot això, es recomana realitzar un tractament insecticida contra aquesta plaga entre els dies 13 i 18 de juny, tots dos inclusivament.

Per a l'elecció del producte a utilitzar els recomanem revisar el quadre de matèries actives i moment d'aplicació, que apareix en el Butlletí d'Avisos número 12 de juny de 2020.

Oïdi (*Erysiphe necator*)

Durant la cerca de postes del cuc del raïm, s'observen alguns grans solts amb símptomes d'oïdi. A més, ens trobem en un moment de màxima sensibilitat per a l'atac del fong, per la qual cosa es recomana mantindre la protecció de les vinyes enfront d'aquesta malaltia.



Míldiu (*Plasmopara vitícola*)

S'estan detectant atacs del fong, tant en fulles com fins i tot en raïms, en els quals, ja s'observa minvament en la quantitat de la collita. Aquests atacs, en general, s'observen en parcel·les amb una mala praxi en el control de la malaltia (escàs volum de caldo d'aplicació, poca o nul·la ventilació dels raïms o aplicacions mal situades o no realitzades a temps).



Atac de míldiu en raïm

La majoria de les taques observades continuen actives, és a dir, amb presència de conidies que originaran noves contaminacions, i si no es combaten adequadament, pot vindre l'explosió de la malaltia.

Per tot això, recomanem l'aplicació de productes fungicides per al control d'aquests símptomes i evitar noves contaminacions, que serien molt perilloses. En aquesta zona vitícola i segons la fenologia del cultiu, els fungicides que recomanem són els pertanyents als grups de "Penetrants" o "Fixació a les ceres cuticulars".

Finalment, els recordem la necessitat d'utilitzar productes autoritzats, respectar la dosi i utilitzar volums de caldo que assegurin una bona protecció del cultiu.

NOTA: Per a l'elecció de qualsevol dels productes a utilitzar els remetem al Butlletí d'Avisos número 8 de maig de 2020.

Silla (València), 11 de juny de 2020

