



VINYA

Avís de tractament per a la zona Terres dels Alforins

*Moixent – La Font de la Figuera – Ontinyent –
Fontanars dels Alforins*

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 2a Generació

L'inici del vol d'aquesta 2^a generació es va produir el dia 22 de juny i quatre dies més tard van començar a observar-se les primeres postes sobre raïms, en les parcel·les més primerenques d'aquesta zona vitícola. S'observa una diferència d'aproximadament 7 dies entre les parcel·les situades en les zones més càlides (Moixent, Ontinyent, La Font) i les més tardanes, situades a Fontanars dels Alforins. En aquests moments predominen les postes de color groc, i fins i tot s'ha observat algun ou fet eclusió.

Des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana realitzar un tractament insecticida per a controlar aquesta plaga. Les dates més indicades per a la realització d'aquest tractament són:

Del 2 al 6 de juliol, tots dos inclosos, a Moixent, La Font de la Figuera i Ontinyent.

Del 8 al 12 de juliol, tots dos inclosos, a Fontanars dels Alforins.



Ou de cuc del raïm recentment posat

Oïdi



S'estan observant alguns símptomes de la malaltia en algunes baies soltes. A més, encara ens trobem en el període de màxima sensibilitat a l'atac del fong, per la qual cosa recomanem mantindre la protecció de les vinyes enfront d'aquesta malaltia.

Símptomes d'oïdi en gra



Míldiu



La majoria dels símptomes de míldiu que s'observen per la zona són taques inactives, és a dir, estan bastant ben controlades. A més les condicions meteorològiques que s'apropen ajudaran a controlar definitivament la malaltia.

No obstant això, recomanem estar atents a possibles canvis meteorològics que podrien afavorir nous atacs del fong, i en aquest cas caldria protegir les vinyes de noves contaminacions.

Atac de míldiu en floració-quallat

NOTA: Les matèries actives a utilitzar per al control dels paràsits citats, les poden consultar al Butlletí d'avísos número 8 de maig de 2020.

Silla (València), 1 de juliol de 2020

