



## VINYA

### *Avís de tractament*

### *La Vall d'Albaida*

#### **Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació**

Els primers adults de la 3a generació del cuc del raïm van ser detectats, en aquesta zona vitícola, en iniciar-se l'última desena del mes de juliol. Durant l'última setmana de juliol van començar a observar-se les primeres postes sobre raïms, els quals, previsiblement començaran la seua eclosió el pròxim cap de setmana.

S'observa un escalonament del vol i posta, la qual cosa, significa que aquesta tercera generació s'allargarà en el temps, pràcticament fins a la verema.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana realitzar un tractament insecticida contra aquesta plaga. Les dates recomanades per a la realització d'aquest tractament són **des del 2 al 6 d'agost, tots dos inclosos**. Es recomana repetir el tractament passada la persistència del producte emprat.



*Ou de Lobesia en cap negre.  
Detall de la larva a l'interior del l'ou*

#### **Oïdi (*Erysiphe necator*)**

Com a conseqüència de la pressió del fong, es continuen observant alguns raïms amb símptomes de la malaltia en algunes parcel·les. Es recomana mantindre la protecció de la vinya enfront d'aquest fong per a evitar badats de baies que provocaran posteriors atacs de *Botrytis*.

#### **Míldiu (*Plasmopara vitícola*)**

De la mateixa manera que ocorre amb l'oïdi, es continuen observant símptomes de míldiu en algunes parcel·les d'aquesta zona vitícola. En aquestes parcel·les es recomana l'aplicació d'algun producte antimíldiu, el qual, evitarà l'aparició dels òrgans de reserva de la malaltia i al mateix temps ajudarà a mantindre més temps la fulla en la planta. Per a aquest cas, són molt recomanables les aplicacions de productes cúprics.



### **Podridura Grisa (*Botrytis cinerea*)**

S'observen bastants ferides en les baies com a conseqüència d'atacs importants d'oïdi o danys pel cuc del raïm. Si les condicions meteorològiques actuals es mantenen, es podran produir atacs importants d'aquest fong a partir d'aquestes dates.

Per aquest motiu, es recomana realitzar un tractament preventiu contra aquesta malaltia. Aquest tractament es realitzarà preferentment en la primera aplicació contra el cuc, i fins i tot també en el segona, però sempre es deixarà transcórrer un període de 21 dies entre l'últim tractament i la verema per a evitar possibles problemes en fermentació dels mostos.



*Focus de Botrytis causat per ferides del cuc del raïm*

**NOTA:** Les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits esmentats les poden consultar al Butlletí d'Avisos número 8, de maig de 2020

Silla (València), 31 de juliol de 2020

