



VINYA

Avís de tractament per a la zona

D.O.P. Vins d'Alacant

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació

La corba de vol d'aquesta 3^a generació es va iniciar durant l'última setmana de juliol. Com ocorre en aquesta generació, les femelles fecundades van començar ràpidament la oviposició sobre les baies, trobant-se les primeres postes cap a finals de juliol. Es preveu que les primeres eclosions es produïsquen a la fi de la present setmana.

Per això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana realitzar un tractament insecticida per a controlar aquesta plaga. Les dates més adequades per a la realització d'aquest tractament són **del 7 a l'11 d'agost, tots dos inclosos**.



*Ou groc sobre baia.
3 – 5 dies per a la seua eclosió.*

Com a conseqüència de l'escalonament de vol i postes, típic d'aquesta tercera generació, es recomana repetir el tractament passada la persistència del producte emprat, especialment en les varietats de recol·lecció tardana.

Per a matisar i/o afinar més en les dates del tractament, recomanem consultar amb els tècnics de les Cooperatives Agroalimentaries de la zona.



Oïdi (*Erysiphe necator*)



Continuem observant símptomes de la malaltia sobre qualsevol òrgan verd de la planta; fins i tot ja es troba localitzat en el sarment, en alguns casos. Malgrat trobar-nos en l'estat fenològic de "verol", recomanem seguir amb la protecció de les vinyes contra aquest fong, per a evitar badats de baies (que en alguns casos ja s'han produït), que posteriorment provocaran atacs de botritis.

*Fort atac d'oïdi.
Grans badats que originaran podridures.*

Míldiu (*Plasmopara vitícola*)

De la mateixa manera que ocorre amb l'oïdi, es continuen observant símptomes de míldiu en algunes parcel·les d'aquesta zona vitícola. Aquesta simptomatologia s'observa preferentment sobre els brots tendres dels sarments.

Es recomana l'aplicació d'un fungicida antimíldiu amb una doble finalitat; d'una banda, evitar l'aparició dels òrgans de reserva del fong (míldiu en mosaic), i per una altra, mantindre el major temps possible la fulla sobre el sarment, per a augmentar les defenses de la planta de cara a la pròxima brotació (molt interessants les aplicacions amb productes cúprics)



*Míldiu en mosaic:
Reserva del paràsit per l'any vinent.*



Podridura Grisa (*Botrytis cinerea*)



Focus de Botrytis cinerea sobre raïm blanc.

Si les condicions meteorològiques actuals es mantenen, es podran produir atacs importants d'aquest fong a partir d'aquestes dates, especialment en aquelles parcel·les on es produïsquen badats de baies per problemes d'oïdi o ferides causades per el cuc del raïm.

Per aquest motiu, es recomana realitzar un tractament preventiu contra aquesta malaltia. Aquest tractament es realitzarà preferentment en la primera aplicació contra el cuc, i fins i tot també en el segon, però sempre es deixarà transcórrer un període de 21 dies entre l'últim tractament i la verema per a evitar possibles problemes en fermentació dels mostos.

NOTA: Les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits esmentats les poden consultar al Butlletí d'Avisos número 8 de maig de 2020.

Silla (València), 4 d'agost de 2020

