



VINYA

Avís de tractament per a la zona centre de València:

Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Turis, Godelleta, Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos, Villar del Arzobispo

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació

Els primers adults de la 3a generació del cuc del raïm van començar a detectar-se cap a mitjan juliol en les zones més primerenques.

A principis d'aquesta setmana, les femelles fecundades van començar la oviposició sobre raïms. Amb les condicions meteorològiques que s'estan donant, aquests ous començaran la seua eclosió el pròxim cap de setmana.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana realitzar un tractament insecticida per a controlar aquesta plaga. Aquest tractament es realitzarà entre els dies 25 i 29 de juliol, tots dos inclosos.



Ou de *Lobesia* en cap negre.
Detall de la larva a l'interior de l'ou

Com a conseqüència de l'escalonament de vol i postes d'aquesta tercera generació es recomana repetir el tractament passada la persistència del producte emprat.

Les vinyes situades en la zona de Villar del Arzobispo porten un retard aproximat d'uns 5 dies en el cicle biològic de la plaga, per la qual cosa el tractament en aquesta zona vitícola es realitzarà entre els dies 29 de juliol i 2 d'agost, tots dos inclosos, i també es repetirà passada la persistència del producte emprat.

Oïdi (*Erysiphe necator*)

Enguany la pressió del fong ha sigut molt elevada i encara s'observen algunes parcel·les amb símptomes de la malaltia. En aquestes parcel·les es recomana mantindre la protecció de la vinya enfront d'aquest fong.



Si s'observen grans badats, seria molt recomanable l'aplicació d'un producte cicatritzant per a evitar possibles atacs de *Botrytis*.

En les parcel·les que hagen iniciat el verol i estiguen lliures de símptomes de la malaltia, no seria necessari realitzar més tractaments contra aquest fong



*Fort atac d'oïdi.
Grans badats que originaran podridures.*

Míldiu (*Plasmopara vitícola*)



De la mateixa manera que ocorre amb l'oïdi, es continuen observant símptomes de míldiu en algunes parcel·les d'aquesta zona vitícola. En aquestes parcel·les es recomana l'aplicació d'algun producte antimíldiu, el qual, evitarà l'aparició dels òrgans de reserva de la malaltia i al mateix temps ajudarà a mantindre més temps la fulla en la planta.

Míldiu en mosaic: reserva del paràsit per a l'any vinent.

Podridura Grisa (*Botrytis cinerea*)

Ja s'ha observat algun focus incipient de *Botrytis* en raïm que encara no ha iniciat el verol, la qual cosa vol dir, que si les condicions meteorològiques actuals es mantenen, es podran produir atacs importants d'aquest fong a partir d'aquestes dates. Per aquest motiu, es recomana realitzar un tractament preventiu contra aquesta malaltia.

Aquest tractament es realitzarà preferentment en la primera aplicació contra el cuc, i fins i tot també en el segon, però sempre es deixarà transcórrer un període de 21 dies entre l'últim tractament i la verema per a evitar possibles problemes en fermentació dels mostos.



← Foco de botritis en raïm abans del verol

Foco de botritis causat per ferides del cuc del raïm ↓



NOTA: Les matèries actives a utilitzar per al control dels paràsits citats, les poden consultar al Butlletí d'avisos número 8 de maig de 2020.

Silla (València), 23 de juliol de 2020

