



## Vinya

### Recomanacions en vinya després d'una pedregada

Amb motiu de la pedra que ha caigut en vinyes situades en la zona d'Utiel-Requena, el Servei de Sanitat Vegetal recomana una sèrie d'actuacions a seguir després d'una pedregada.

En primer lloc, és important tindre en compte que cada vinya pot ser un cas particular, ja que els danys ocasionats per la pedra poden ser molt variables, depenent tant de la intensitat de la pedregada, com de l'estat vegetatiu i susceptibilitat de la pròpia vinya.

Com a norma general i primera intervenció es recomana la realització d'un tractament fitosanitari que afavorisca la cicatrització de les ferides. Es poden utilitzar formulats a base de folpet (llegir prèviament l'etiqueta per a veure les seues autoritzacions d'ús) o productes cúprics autoritzats en el cultiu (en el cas de vinyes ecològiques). Aquest primer tractament amb un producte cicatritzant s'ha de realitzar al més prompte possible, i a més es recomana que vaja acompanyat amb algun fungicida antimildiu, que reforce l'acció dels productes anteriorment esmentats (preferentment del grup dels "Penetrants" o de "Fixació a les ceres cuticulars")

Quant al maneig de la poda, a l'hora d'actuar caldrà distingir tres casos:

- Vinyes poc afectades
- Vinyes prou afectades
- Vinyes molt afectades

#### **Vinyes poc afectades:**



Considerem "vinyes poc afectades" aquelles en que gran part de la vegetació està sana i queden suficients rams com per a obtenir una collita acceptable. Continuarem tractant la vinya contra els paràsits que el puguen afectar, i eliminarem els sarments danyats en la pròxima poda d'hivern.



### **Vinyes prou afectades:**



Considerem “vinyes prou afectades” aquelles en les quals ha quedat poca vegetació i algun ram. En aquest cas, a més de realitzar el tractament cicatritzant i mantindre els tractaments i tècniques culturals habituals del cultiu, es realitzarà un nou desronyat, eliminant tots els rebrots que no presenten cap d'interés. És important no eliminar els brots axil·lars, ja que els nets o brots axil·lars ens aportaran una superfície foliar necessària per a acumular reserves de cara al pròxim any. Posteriorment, en la poda d'hivern s'eliminaran els sarments danyats.



### **Vinyes molt afectades:**

Considerem “vinyes molt afectades” aquelles en les quals pràcticament no ha quedat vegetació, i molt pocs, o cap ram. En aquest apartat distingirem dos casos:

- Si no està afectat el primer entrenuc del brot d'enguany, s'ha de podar la primera gemma axil·lar del primer brot. Aquesta gemma ens proporcionarà bona fusta per a l'any vinent i pot donar collita, encara que de mala qualitat. Es realitzarà un nou desronyat i no s'eliminaran els nous brots axil·lars sobre els nous pàmpols.
- Si estan molt afectats els primers entrenucs del brot de l'any es podarà a la cega i s'eliminaran els brots danyats amb la mà. Es realitzarà un nou desronyat, sense eliminar els nous brots axil·lars sobre els nous pàmpols.



Silla (València), 16 de juliol de 2020