




Estadísticas sobre el aprovechamiento de anguila (*Anguilla anguilla*) en la Comunitat Valenciana


2013

1. ANGUILA

1.1. CAPTURAS MEDIAS

CAPTURAS MEDIAS ANUALES DE ANGUILA DE LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS (KG)			
	Capturas (kg)	Extensión (ha)	Capturas / superficie (kg/ha)
Albufera de Valencia	6663,52	2100,00	3,17
Marjal de Pego-Oliva	1169,88	290,00	4,03
Hondo de Elche*	377,50	126,00	3,00
Salinas de Santa Pola	2323,33	563,00	4,13
Totales	10534,23	3079,00	3,42


La mayor parte de las capturas de anguila en la Comunitat Valenciana se realizan en la Albufera de Valencia, aunque el ratio “capturas por unidad de superficie” es superior en las Salinas de Santa Pola y en la Marjal de Pego-Oliva.



% de las capturas medias totales obtenidas en toda la Comunitat Valenciana para cada zona de pesca de anguila.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CAPTURAS




Evolución histórica de las capturas de anguila en la lago de la Albufera de Valencia, en kilogramos.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

La evolución de las capturas de anguila en la zona de la Albufera de Valencia muestra una reducción actual de casi el 94% respecto a las capturas que se realizaban en la década de 1950-59.

1.3. ESFUERZO PESQUERO

1.3.1. JORNADAS DE PESCA REALIZADAS




Número de jornadas de pesca realizadas por la agrupación de pescadores del río Molinell.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

El mayor esfuerzo pesquero para la captura de anguila en la Comunitat Valenciana se realiza desde mediados de Noviembre hasta mediados de Febrero.

1.3.2. CAPTURAS POR JORNADA DE PESCA Y PUESTO



Capturas de anguila obtenidas, en kilogramos, por cada jornada de pesca y puesto con actividad.


Fuente: Elaboración propia, 2013.

El rendimiento medio que se viene obteniendo por puesto y jornada de pesca en la CV durante la última década es de 8,55 kg de anguila, oscilando entre los 6,3 kg de la temporada 2008/09 y los 16,4 kg de la temporada 2004/05.

2. ANGULA

2.1. CAPTURAS MEDIAS


Capturas medias anuales de angula de las últimas temporadas (kg)							
	Totales	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Gola Trenc	6,03	0	0	1,20	1,38	2,41	1,03
Gola Casablanca	12,96	0	0,21	1,53	3,69	3,67	3,86
Gola Puchol	70,22	0	4,77	28,71	28,35	7,87	0,53
Gola Perellonet	71,77	0	6,16	23,88	30,93	9,08	1,71
Gola Perelló	23,05	0	0,00	3,08	13,06	6,32	0,60
Gola del Rei	12,65	0	0,00	7,78	4,61	0,26	0,00
Gola de S. Llorenç	5,00	0	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00
Río Vaca	5,80	0	0,00	0,00	5,47	0,33	0,00
Río Molinell	56,23	1,77	8,19	16,50	12,56	11,31	5,90
Totales	263,71	1,77	19,34	82,69	104,04	42,25	13,63
Porcentaje		0,67%	7,3%	31,4%	39,5%	16,0%	5,2%



Capturas medias anuales por zona de pesca autorizada de angula durante las últimas temporadas, en kilogramos.

Fuente: Elaboración propia, 2013.


La capturas más relevantes durante los últimos años se vienen obteniendo en las Golas de Puchol y Perellonet, así como en el río Molinell, con unos valores medios de 70,22 kg, 71,77 kg y 56,23 kg respectivamente.



Distribución mensual de las capturas medias anuales de angula obtenidas en toda la Comunitat Valenciana, en kilogramos. Fuente: Elaboración propia, 2013

En la Comunitat Valenciana las capturas de angula se concentran fundamentalmente en los meses de Diciembre y Enero, hasta mediados de Febrero.

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CAPTURAS



Evolución histórica de las capturas de angula en las golas (desembocaduras) del lago de la Albufera de Valencia, en kilogramos. Fuente: Elaboración propia, 2013.

En el caso de las capturas de angula los datos históricos son muy escasos y discontinuos. Para la zona de la Albufera se observa un descenso generalizado muy importante en esta variable a lo largo de las últimas décadas.

Capturas medias anuales (Kg)			
	Hasta 1963	Desde 1999	Variación
Gola del Perelló	942	23,05	-97,55%
Gola del Perellonet	2158	71,77	-96,67%
Gola de Puchol	6204	70,22	-98,87%
Total	9304	165,04	-98,23%


Comparativa entre las capturas medias anuales de angula en las golas (desembocaduras) del lago de la Albufera de Valencia, correspondientes al primer periodo histórico con datos y a la actualidad, en kilogramos.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Las capturas medias de angula, correspondientes a los periodos 1949-1963 y 1999-actualidad, muestran una reducción del 98% en la zona de la Albufera de Valencia.

2.3. ESFUERZO PESQUERO


2.3.1. JORNADAS DE PESCA REALIZADAS



Número medio de jornadas de pesca de angula realizadas anualmente. Fuente: Elaboración propia, 2013.

El mayor esfuerzo pesquero para la captura de angula en la Comunitat Valenciana se realiza también en los meses de Diciembre y Enero.

2.3.2. CAPTURAS POR JORNADA DE PESCA Y PUESTO



Capturas de angula obtenidas, en kilogramos, por cada jornada de pesca y puesto con actividad. Fuente: Elaboración propia, 2013.

Los rendimientos unitarios (capturas por jornada y puesto) de angula oscilan notablemente a lo largo de los últimos años, destacando en todo caso los valores alcanzados en la zona del río Molinell y, más recientemente, del río Vaca.