




Barranc de la Safor

Ordre de declaració	DOCV núm. 6450 (pàg. 4796 - 4797) d'1 de febrer de 2011 http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/01/pdf/2011_969.pdf				
Modificada en Ordre	DOCV núm. 7328 (pàg. 18860) de 30 de juliol de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf				
Municipi	Vilallonga	Comarca	La Safor	Província	València
Superfície	0,40 ha	Altitud	195 - 245 m	UTM	30SYJ3806, YJ3906
Titularitat	Domini Públic Hidràulic				
Litologia	Dolomies		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Termomediterrani		Ombroclima	Humit	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Serra de la Safor (ES5233041) Paisatge Protegit del Serpis				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/xkVdSXaKMCuhHW2X8				





Nombre d'espècies de flora vascular: 103

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)

Anarrhinum laxiflorum (P, R)
Arenaria aggregata subsp. *pseudoarmeriastrum* (E, R)
Arenaria valentina (E)
Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)
Centaurea aspera subsp. *stenophylla* (E)
Centaureum quadrifolium subsp. *barrelieri* (E)
Chaenorhinum crassifolium subsp. *crassifolium* (E)
Elaoselinum tenuifolium (E)
Erysimum gomezcampo (E)
Guillonea scabra (E)
*Iberis carnos*a subsp. *hegelmaieri* (E)

Leucanthemum gracilicaule (E)
Pimpinella propinqua (E, R)
Pteris vittata (P, R)
Reseda valentina (E)
Rhamnus lycioides (E)
Satureja obovata subsp. *valentina* (E)
Selaginella denticulata (R)
Teucrium buxifolium subsp. *buxifolium* (E, R)
Teucrium ronnigeri subsp. *ronnigeri* (E)
Thymus piperella (E)
Thymus vulgaris subsp. *aestivus* (E)
Trisetum velutinum (E, R)



Pteris vittata és una falguera molt rara en la flora valenciana, inclosa en el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades en la categoria d'espècies *Vulnerables*.



Inflorescència d'*Anarrhinum laxiflorum*, l'altra espècie protegida present a la microreserva.

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Prats humits mediterranis d'herbes altes del *Molinio-Holoschoenion* (6420).
- Galeries i matolls riberencs termomediterranis (*Nerio-Tamaricetea* i *Securinegion tinctoriae*) (92D0).

Pla de gestió

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/01/pdf/2011_969.pdf



Vegetació de l'interior del barranc on es barregen les formacions de baladre (*Nerium oleander*), diversos arbustos com l'esbarzer (*Rubus ulmifolius*) i els pins blancs (*Pinus halepensis*).

Accions addicionals de conservació

- Desbrossament anual de les formacions d'esbarzer (*Rubus ulmifolius*) amb l'objectiu de millorar l'estat de conservació de la població de *Pteris vittata*.

Comentaris

En aquesta microreserva es troba una de les millors poblacions valencianes de l'espècie protegida *Pteris vittata*. També es poden observar exemplars d'una de les poques poblacions valencianes



conegudes d'*Anarrhinum laxiflorum*. A més a més, hi ha també algunes espècies endèmiques i rares, com ara *Arenaria aggregata* subsp. *pseudoarmeriastrum*, *Arenaria valentina*, *Elaeoselinum tenuifolium*, *Iberis carnosa* subsp. *hegelmaieri*, *Pimpinella propinqua*, *Teucrium buxifolium* subsp. *buxifolium* o *Trisetum velutinum*.

Bibliografia

- Güemes, J., E. Carrión, P. Blasco & J.E. Oltra (2011). *Anarrhinum laxiflorum* Boiss. (Scrophulariaceae), una especie nueva para la flora valenciana. *Flora Montiberica* 47: 107-113.
- Oltra, J.E. & A. Navarro (2009). Algunes plantes noves o poc citades per a la comarca de la Safor. *Toll Negre* 11: 114-118.