




Pla de Junquera

Ordre de declaració	DOGV núm. 4390 (pàg. 30386 - 30387) de 2 de desembre de 2002 http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf				
Modificada en Ordre	DOCV núm. 7328 (pàg. 18858) de 30 de juliol de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf				
Municipi	Pinet	Comarca	La Vall d'Albaida	Província	València
Superfície	19,18 ha	Altitud	580 - 625 m	UTM	30SYJ3218, YJ3318
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de l'Ajuntament de Pinet V020V3006				
Litologia	Dolomies i calcàries		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Subhumit	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	ZEC Serres del Montdúver i Marxuquera (ES5233015) Paratge Natural Municipal El Surar				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/g3uswDrwqUwdfmHWA				





Nombre d'espècies de flora vascular: 169

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)

<i>Anacamptis champagneuxii</i> (R)	<i>Linum trigynum</i> (R)
<i>Agrostis tenerrima</i> (R)	<i>Lotus parviflorus</i> (R)
<i>Airopsis tenella</i> (R)	<i>Muscari atlanticum</i> (R)
<i>Biscutella dufourii</i> (E, R)	<i>Neotinea conica</i> (P, R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Odontites recordonii</i> (E)
<i>Bufoia perennis</i> subsp. <i>tuberculata</i> (E, R)	<i>Ophrys dyris</i> (R)
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Ophrys luentina</i> (E, R)
<i>Centaurea setabensis</i> subsp. <i>setabensis</i> (E)	<i>Orchis anthrophora</i> (P, R)
<i>Centaureum quadrifolium</i> subsp. <i>barrelieri</i> (E)	<i>Ornithopus compressus</i> (R)
<i>Centaureum maritimum</i> (R)	<i>Paronychia echinulata</i> (R)
<i>Cephalanthera longifolia</i> (R)	<i>Quercus suber</i> (R)
<i>Cistus crispus</i> (R)	<i>Romulea columnae</i> (R)
<i>Crocus salzmännii</i> (R)	<i>Scleranthus polycarpus</i> (R)
<i>Dianthus saetabensis</i> subsp. <i>contestanus</i> (E, R)	<i>Sideritis dianica</i> (E, R)
<i>Dictamnus hispanicus</i> (E, R)	<i>Stachys arvensis</i> (R)
<i>Daucus crinitus</i> (P, R)	<i>Stachys heraclea</i> (R)
<i>Echium flavum</i> subsp. <i>saetabense</i> (P, E, R)	<i>Stachys officinalis</i> (R)
<i>Euphorbia isatidifolia</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Gagea foliosa</i> subsp. <i>durieui</i> (R)	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (E)
<i>Galium valentinum</i> (E)	<i>Thymus piperella</i> (E)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Tolpis umbellata</i> (R)
<i>Juncus capitatus</i> (P, R)	<i>Tuberaria lignosa</i> (R)
<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)	<i>Urginea undulata</i> subsp. <i>caeculi</i> (E, R)

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Suredes de *Quercus suber* (9330).

Pla de gestió

http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Inflorescència de l'orquídia *Neotinea conica*, una de les espècies protegides de la microreserva (esquerra) i *Stachys arvensis*, espècie rara en la flora valenciana lligada a sòls pobres en bases (dreta).



Aspecte dels exemplars de surera (*Quercus suber*) i de la comunitat herbàcia en recuperació després dels efectes de l'incendi de 2018.



Accions addicionals de conservació

- Realització de desbrossaments de la comunitat arbustiva amb la finalitat de crear clars que puguen afavorir el creixement d'algunes espècies d'interés.

Comentaris

Aquesta microreserva presenta una gran diversitat de flora, amb diverses espècies endèmiques i altres de rares. Entre els endemismes es pot destacar *Echium flavum* subsp. *saetabense*, *Dictamnus hispanicus*, *Ophrys lucentina* o *Sideritis dianica*. Destaca sobretot la presència d'espècies vinculades a sòls pobres en bases com ara *Tuberaria lignosa*, *Ornithopus compressus*, *Paronychia echinulata*, *Tolpis umbellata*, *Stachys arvensis*, *Agrostis tenerrima*, *Lotus parviflorus*, *Thymelaea pubescens* subsp. *pubescens*, *Airopsis tenella* o *Centaureum maritimum*.

El 6 d'agost de 2018 es va produir un incendi que va afectar de manera intensa tota la microreserva. Després de l'incendi la part aèria dels exemplars de surera ha rebrotat amb vigor i es fa un seguiment per a avaluar els efectes de l'incendi sobre altres espècies com ara l'orquídia *Neotinea conica*.

Bibliografia

- Oltra, J.E & A. Conca (2006). Aportacions a la flora de la comarca de la Vall d'Albaida. *Toll Negre* 8: 13-20.
- Oltra, J.E. & A. Conca (2008a). Aportacions a la flora de la comarca de la Vall d'Albaida, II. *Toll Negre* 10: 43-50.
- Oltra, J.E & A. Conca (2008b). Algunes localitats noves per a *Chaenorhinum tenellum* (Cav.) Lange i *Echium flavum* subsp. *saetabense* (Peris Figuerola & Stübing) Mateo & M.B. Crespo. *Toll Negre* 10: 112-114.
- Oltra, J.E, A. Conca & I. Garrido (2012). Aportacions a la flora de la comarca de la Vall d'Albaida (València), III. *Flora Montiberica* 53: 63-71.
- Oltra, J.E., L. Serra & E. Laguna (2020). Sobre l'enquadrament sintaxonòmic dels brugars valencians. *Nemus* 10: 146-154.