




Cim de Crevillent

Ordre de declaració	DOGV núm. 3505 (pàg. 8924 - 8925) de 28 de maig de 1999 http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf				
Municipi	Crevillent	Comarca	El Baix Vinalopó	Província	Alacant
Superfície	12,32 ha	Altitud	590 - 820 m	UTM	30SXH8638, XH8738
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública propietat de l'Ajuntament de Crevillent AL044AL3055				
Litologia	Calcàries i dolomies		Sector corològic	Alacantí	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Semiàrid	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Serra de Crevillent (ES5213022)				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/QJdCKTvCJ8jDATbk9				





Nombre d'espècies de flora vascular: 62

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

Apteranthes munbyana subsp. *hispanica* (P, E, R)

Centaurea setabensis subsp. *setabensis* (E)

Daucus durieu (R)

Dianthus broteri subsp. *valentinus* (E)

Dianthus saetabensis subsp. *contestanus* (E, R)

Epipactis tremolsii (P, R)

Hypericum ericoides (E)

Iberis carnosia subsp. *hegelmaieri* (E)

Paronychia suffruticosa (E)

Phlomis crinita (E)

Rhamnus borgiae (E)

Rhamnus lycioides (E)

Satureja obovata subsp. *canescens* (E, R)

Teucrium buxifolium subsp. *rivasii* (E, R)

Teucrium ronnigeri subsp. *ronnigeri* (E)



Apteranthes munbyana subsp. *hispanica* (dalt) és una espècie iberoafricana (Espanya, el Marroc i Algèria), al continent europeu és exclusiva d'Albacete, Alacant, Múrcia i València. La cresolera (*Phlomis crinita*) forma part de brolles seques i assolellades (dreta).



Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Carrascars de *Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia* (9340).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Vista de la microreserva, en la qual s'observen les comunitats d'espècies rupícoles i els fragments de carrascat/coscollar.

Accions addicionals de conservació

- Control de la vegetació i eliminació d'exemplars de pi blanc (*Pinus halepensis*) per a reduir-ne la combustibilitat i millorar l'estat de conservació del coscollar/carrascat.
- Plantació d'espècies estructurals del coscollar/carrascat (*Quercus coccifera*, *Q. ilex* subsp. *rotundifolia*, *Arbutus unedo*, etc.).
- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.

Comentaris

Les flors dels ditets de terra (*Apteranthes munbyana* subsp. *hispanica*) desprenen una olor de podrit o de descomposició per a atraure els pol·linitzadors, que són principalment dípters (mosques).

Bibliografia

Serra, L., A. Olivares, J. Pérez Botella, V. Deltoro, J.J. Izquierdo, B. Pérez Rocher, M.A. Gómez Serrano & O. Mayoral García-Berlanga (2002). Sobre *Caralluma munbyana* subsp. *hispanica* (Asclepiadaceae) en la Comunidad Valenciana. *Anales del Jardín Botánico de Madrid*, 60(2): 451-453.