




## El Recingle

<b>Ordre de declaració</b>	DOGV núm. 3928 (pàg. 1911 - 1912) de 30 de gener de 2001 <a href="http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf">http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf</a>				
<b>Municipi</b>	Agres	<b>Comarca</b>	El Comtat	<b>Província</b>	Alacant
<b>Superfície</b>	0,84 ha	<b>Altitud</b>	1225 - 1250 m	<b>UTM</b>	30SYH1694, YH1693
<b>Titularitat</b>	Forest d'Utilitat Pública de la Generalitat Valenciana AL047AL1003				
<b>Litologia</b>	Calcàries i margues		<b>Sector corològic</b>	Setabenc	
<b>Termoclima</b>	Mesomediterrani		<b>Ombroclima</b>	Subhumit	
<b>Espai Protegit / Xarxa Natura 2000</b>	LIC Serres de Mariola i del Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parc Natural de la Serra de Mariola				
<b>Localització / Accés</b>	<a href="https://goo.gl/maps/sztUd41gFjvTXw9R9">https://goo.gl/maps/sztUd41gFjvTXw9R9</a>				





Nombre d'espècies de flora vascular: 73

Flora protegida (P)<sup>1</sup> endèmica (E) o rara (R)

<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> (E)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Linaria cavanillesii</i> (E, R)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (E, R)	<i>Paronychia aretioides</i> (E)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Prunus prostrata</i> (R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Cirsium valentinum</i> (E)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Crocus salzmännii</i> (R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Erodium saxatile</i> (E, R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Erucastrum virgatum</i> subsp. <i>brachycarpum</i> (E)	<i>Sternbergia colchiciflora</i> (P, R)
<i>Erysimum gomezcampoi</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Euphorbia isatidifolia</i> (E)	



*Sternbergia colchiciflora* (dreta) és una espècie bulbosa de prats sobre sòls poc profunds. *Erodium saxatile* (esquerra) creix en replans i clivells de penyals calcaris, a les muntanyes del sud de la província de València i nord de la d'Alacant.

<sup>1</sup> La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.  
[http://www.dogv.qva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.qva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)



### Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)

- Pendent rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Matollars termomediterranis i preestèpics (5330).

### Pla de gestió

[http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001\\_670.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf)



Vista de la microreserva, en la qual s'observa el salviar.

### Accions addicionals de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.
- Eliminació d'exemplars de *Pinus halepensis* per a disminuir la combustibilitat i afavorir les espècies típiques de l'hàbitat del salviar.