




Ombria de l'Algaiat

Orden de declaración	DOGV nº 4390 (pág. 30396 - 30397) de 2 de diciembre de 2002 http://www.dogv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13219.pdf				
Municipio	La Romana	Comarca	El Vinalopó Mitjà	Provincia	Alicante
Superficie	20 ha	Altitud	825 - 1055 m	UTM	30SXH8044, XH8144
Titularidad	Monte de Utilidad Pública del Ayuntamiento de la Romana AL070				
Litología	Calcáreas y dolomías		Sector corológico	Alicantino	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Semiárido	
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/vHUVMC8HaQj3kKub6				





Número de especies de flora vascular: 85

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Aethionema marginatum</i> (R)	<i>Erodium sanguis-christi</i> (E, R)
<i>Anthyllis terniflora</i> (E, R)	<i>Erysimum gomezcampoi</i> (E)
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>reuteri</i> (R)	<i>Galium valentinum</i> (E)
<i>Apteranthes munbyana</i> subsp. <i>hispanica</i> (E, R)	<i>Guillonea scabra</i> (E)
<i>Arenaria montana</i> subsp. <i>intricata</i> (E)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Biscutella lucentina</i> (E, R)	<i>Reseda barrelieri</i> (E, R)
<i>Biscutella rosularis</i> (E, R)	<i>Rhamnus borgiae</i> (E)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Rhamnus lycioides</i> (E)
<i>Centaurea antennata</i> subsp. <i>meridionalis</i> (E, R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Satureja obovata</i> subsp. <i>canescens</i> (E, R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Coris monspeliensis</i> subsp. <i>syrtica</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>hypocistis</i> (R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Dianthus broteri</i> subsp. <i>valentinus</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Ephedra fragilis</i> (R)	<i>Silene saxifraga</i> (R)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Teucrium botrys</i> (R)
<i>Epipactis tremolsii</i> (P, R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat Prioritario*)

- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13219.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Apteranthes munbyana subsp. *hispanica* (izquierda) es un endemismo iberolevantino de distribución restringida que encontramos en zonas secas, pedregosas y soleadas, refugiada a la sombra de la vegetación o en grietas de rocas. *Erodium sanguis-christi* (arriba) coloniza suelos pedregosos y rocosos; esta localidad es la más meridional del territorio valenciano.



Vista de la microrreserva, en la que se observa la comunidad de especies rupícolas y los fragmentos de carrascal.



Acciones adicionales de conservación

- Tratamiento de la vegetación para disminuir la combustibilidad y mejorar el estado de conservación de los fragmentos de carrascal.
- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.
- Colonización asistida de *Quercus coccifera*.

Comentarios

El boj (*Buxus sempervirens*) solo es conocido en cuatro localidades alicantinas (Serres del Montgó, Mariola, Salinas y l'Algaiat) Esta microrreserva alberga el núcleo poblacional más meridional.