




Ombria del Mas del Carrascal

Orden de declaración	DOGV nº 4988 (pág. 12895 - 12897) de 19 de abril de 2005 http://www.dogv.gva.es/datos/2005/04/19/pdf/2005_4015.pdf				
Municipio	Castalla	Comarca	L'Alcoià	Provincia	Alicante
Superficie	20 ha	Altitud	1015 - 1220 m	UTM	30SXH9771, SXH9871, SXH9872
Titularidad	Propiedad privada (Sociedad mercantil)				
Litología	Calcáreas y arcillas		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Seco tendente a semiárido	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Maigmo i Serres de la Foia de Castalla (ES5212008) Paisaje Protegido de la Serra del Maigmo y Serra del Sit				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/dci9s83nAy7zeiq67				





Número de especies de flora vascular: 80

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

Aethionema marginatum (R)

Biscutella lucentina (E, R)

Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)

Campanula hispanica (E, R)

Centaurea boissieri subsp. *mariolensis* (E)

Centaurea setabensis subsp. *setabensis* (E)

Chaenorhinum crassifolium subsp. *crassifolium* (E)

Cistus laurifolius (R)

Dictamnus hispanicus (E, R)

Epipactis kleinii (E)

Iberis carnosa subsp. *hegelmaieri* (E)

Linaria depauperata subsp. *hegelmaieri* (P, E, R)

Paronychia aretioides (E)

Reseda valentina (E)

Scabiosa turolensis (E)

Sideritis tragoriganum subsp. *tragoriganum* (E)

Teucrium buxifolium subsp. *rivasii* (E, R)

Teucrium ronnigeri subsp. *ronnigeri* (E)

Teucrium thymifolium (E)

Thymus piperella (E)



Dictamnus hispanicus (izquierda) forma parte de pastizales bajo ombroclima subhúmedo, en poblaciones dispersas con pocos individuos. *Linaria depauperata* subsp. *hegelmaieri* (arriba) es una de las especies más características de la vegetación sobre dunas continentales (psammófilas).

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario*)

- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyso-Sedion albi* (6110*).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Desprendimientos rocosos mediterráneos occidentales (8130).
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2005/04/19/pdf/2005_4015.pdf



Vista de la microrreserva, en la que se observan las formaciones de carrascal y los pastizales en los claros de la superficie arbolada.

Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.